


# Risultati del sondaggio internazionale **We Care** 2017

Il sondaggio We Care 2017, che includeva 9.629 partecipanti provenienti da 6 paesi, è stato commissionato per comprendere meglio i livelli di consapevolezza pubblica del cancro della vescica, nonché per determinare gli ostacoli al miglioramento degli esiti dei pazienti in Europa e in Canada.<sup>1</sup>

**Il cancro della vescica è uno dei 10 tipi di cancro più frequenti a livello mondiale, e causa 165,000 decessi all'anno in tutto il mondo.<sup>2</sup>**



**165,000**

decessi all'anno in tutto il mondo.<sup>2</sup>

**65+** 

Gli uomini anziani hanno maggiori probabilità di essere affetti da cancro della vescica, ma possono essere colpite persone di ogni età.<sup>2</sup>




Se la diagnosi avviene nelle fasi avanzate, quando la malattia si è diffusa oltre il rivestimento dell'organo, il cancro della vescica è associato a un tasso di sopravvivenza basso pari al 5%.<sup>3</sup>



Nonostante tutto questo, la consapevolezza pubblica della malattia resta bassa.<sup>4</sup>

## La consapevolezza del cancro della vescica



Circa **1 adulto su 10** dichiara di non avere mai sentito parlare di cancro della vescica

## La consapevolezza dei segni e dei sintomi



**62%**

Il 62% degli adulti dichiara di non conoscere i segni e i sintomi del cancro della vescica

I sintomi più frequenti del cancro della vescica sono:<sup>5,6</sup>



**Sangue nelle urine o cambiamenti del colore delle urine**



**Dolore addominale (al basso ventre)**



**Dolore nella zona lombare**




**Irritazione della vescica. Bisogno improvviso o più frequente di urinare**

## L'esperienza personale con segni e sintomi della malattia


Degli intervistati:




Quasi **1 su 10** dichiara di avere visto sangue nelle urine



Circa **1 su 5** dichiara di avere avvertito dolore allo stomaco per 3 mesi o più



Più di **1 su 4** dichiara di avere avvertito un aumento della frequenza urinaria per 3 mesi o più



Più di **1 su 3** dichiara di avere avvertito dolore nella zona lombare per 3 mesi o più

## Agendo sui sintomi

**52%**



Il 52% delle persone che hanno avvertito uno dei sintomi del cancro della vescica, non sono andati dal medico, aspettando che si risolvesse

**54%**



Il 54% delle persone ha dichiarato che in caso di sintomo di cancro della vescica non avrebbero detto nulla ai propri familiari, per non allarmarli

- Quasi due terzi delle persone non riescono a identificare i segni e i sintomi del cancro della vescica
- Un numero significativo di persone che nota segni e sintomi del cancro della vescica decide di non rivolgersi al medico.
- È importante, soprattutto per le persone a rischio (anziani e in modo specifico uomini e fumatori), essere consapevoli dei segni e sintomi del cancro della vescica per individuarli precocemente e intervenire<sup>6</sup>



1. Il sondaggio We Care 2017 è stato modificato e distribuito da Atomik Research, Londra, Regno Unito il 6-23 gennaio 2017.

2. World Health Organization. GLOBOCAN 2012: Estimated cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. Disponibile su: [http://globocan.iarc.fr/Pages/fact\\_sheets\\_population.aspx](http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx) Ultimo accesso novembre 2016.

3. National Cancer Institute. SEER Stat Fact Sheets: Bladder Cancer. Disponibile su: <http://seer.cancer.gov/statfacts/html/urinb.html> Ultimo accesso novembre 2016.

4. Quale, DZ. Bladder Cancer Patient Advocacy: A Global Perspective. Bladder Cancer. 2015;1(2): 117-122. Disponibile su: <https://bladdercancerpatientadvocacy.pdf> Ultimo accesso marzo 2017

5. National Cancer Institute. Bladder Cancer Treatment (PDQ®)-Patient Version. Disponibile su: <http://www.cancer.gov/types/bladder/patient/bladder-treatment-pdq> Ultimo accesso marzo 2017

6. Patient. Bladder Cancer. Disponibile su: <http://patient.info/health/bladder-cancer-leaflet> Ultimo accesso novembre 2016.